



- adaptiv
- modular
- sprachfreies Aufgabenmaterial
- Paralleltestform
- Rasch-Modell-konform
- Zusatzgerät erforderlich
- hohe Testsicherheit
- breites Normspektrum
- CogniPlus-Verknüpfung
- Testform vorhanden für Online-Vorgabe open mode

- Arabisch
- Bosnisch
- Bulgarisch
- Chinesisch (Kurzzeichen)
- Chinesisch (Langzeichen)
- Dänisch
- Deutsch
- Englisch
- Estnisch
- Farsi
- Finnisch
- Französisch
- Griechisch
- Niederländisch
- Hindi
- Isländisch
- Italienisch
- Japanisch
- Kroatisch
- Polnisch
- Portugiesisch Brasilien
- Portugiesisch
- Rumänisch
- Russisch
- Schwedisch
- Serbisch
- Slowakisch
- Slowenisch
- Spanisch
- Tschechisch
- Türkisch
- Ungarisch
- Urdu
- Vietnamesisch



Einsatz

Erfasst innere Fehlhaltungen, die zu Alkoholmissbrauch führen können.

Das praktische Bedürfnis für das Alkoholiker-Trenn-Verfahren entsteht durch die Notwendigkeit, Alkoholgefährdung zu erkennen, wie sie beispielsweise in der Verkehrspsychologie, aber auch der Klinischen Neuropsychologie, gegeben ist.

Aufgabe der Testperson

Die Testperson gibt an, ob verschiedene Aussagen auf sie zutreffend sind. Die Antworten können einmal korrigiert und Aussagen übersprungen werden.

Testformen

- S1: Langform.
- S2: Kurzform.

Auswertung

Folgende Hauptvariable wird ausgewertet: Alkoholgefährdung. Die NebenvARIABLE Lügenwert kontrolliert das Ausmaß des sozial erwünschten Antwortens.

Dauer

Je nach Testform ca. 7–9 Minuten.

Vorgabealter

Normen ab 12 Jahren.

Auswertungselemente

<input checked="" type="checkbox"/>	Tabelle	<input type="checkbox"/>	Testprotokoll
<input type="checkbox"/>	Profil	<input checked="" type="checkbox"/>	Itemanalyseprotokoll
<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeitungszeit	<input type="checkbox"/>	Verlaufsdarstellung
<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidenzintervall	<input type="checkbox"/>	Spezielle grafische Ergebnisdarstellung
<input type="checkbox"/>	Profilanalyse	<input type="checkbox"/>	Aufbereiteter Word-Report