BAI

Beck Angst-Inventar

J. Margraf & A. Ehlers © SCHUHFRIED GmbH

Nr. 1 von 21		adaptiv		□ Zus	satzgerät erforderlich
		modular		□ hoh	ne Testsicherheit
Taubheit oder Kribbeln		sprachfreies Aufgabenmaterial		□ bre	ites Normspektrum
		Paralleltestform [CogniPlus-Verknüpfung
		Rasch-Modell-konform		□ Tes	stform vorhanden für
0 Überhaupt nicht				Onl	line-Vorgabe open mode
Wenig					
Es störte mich nicht sehr	□ <i>A</i>	Arabisch	☐ Griechisc	h	□ Russisch
2 Mittel		Bosnisch	□ Niederlän	idisch	☐ Schwedisch
Es war sehr unangenehm, aber ich konnte es aushalten		Bulgarisch	☐ Hindi ☐ Isländisch		☐ Serbisch☐ Slowakisch
3 Stark		Chinesisch (Kurzzeichen) Chinesisch (Langzeichen)	☐ Italienisch		☐ Slowakisch
Ich konnte es kaum aushalten		Dänisch	☐ Japanisch		□ Spanisch
		Deutsch	☐ Kroatisch		☐ Tschechisch
		Englisch	□ Polnisch		□ Türkisch
Maitan		Estnisch	☐ Portugies		•
Weiter		rarsi Finnisch	□ Portugies□ Rumänise		□ Urdu □ Vietnamesisch
		ranzösisch	L Rumanist	J11	- Viculatilesiscii









-Staff & Management Assessments
-Manufactoring & Safety Assessments
-Job & Career Placements
-Academic Testing

Einsatz

Erfasst das Ausmaß von klinischer Angst. Dieses Selbstbeurteilungsinstrument ist für die Differentialdiagnostik von Angststörungen und subklinischer Angst bzw. für die Abgrenzung zur depressiven Symptomatik einsetzbar. Es liefert relevante Informationen für die Beurteilung von Therapieindikation und -verlauf.

Aufgabe der Testperson

Der Testperson werden deskriptive Aussagen zu Angstsymptomen vorgegeben. Diese bewertet sie auf einer vierstufigen Antwortskala nach der Intensität des Auftretens in der vergangenen Woche. Dabei hat sie keine zeitliche Vorgabe und kann gegebenenfalls die jeweils vorherige Antwort wiederholt bearbeiten.

Testformen

Eine Testform.

Auswertung

Folgende Hauptvariable wird ausgewertet:

Summenwert – Maß für die subjektiv empfundene Ängstlichkeit. Der Summenwert wird zur Grobklassifikation herangezogen, einer groben und überblicksmäßigen Einteilung in vier Klassen von "minimaler Angst" bis hin zu "klinisch relevanter Angst".

Dauer

Ca. 9 Minuten.

Vorgabealter

Normen ab 16 Jahren (Anfallsstichprobe).

Besonderheiten

Spezialnormen von Personen mit unterschiedlichen psychischen Störungen vorhanden.

Auswertungselemente

x	Tabelle		Testprotokoll
x	Profil	х	Itemanalyseprotokoll
x	Bearbeitungszeit		Verlaufsdarstellung
	Konfidenzintervall		Spezielle grafische Ergebnisdarstellung
	Profilanalyse		Aufbereiteter Word-Report

WIENER TESTSYSTEM OSCHUHFRIED